

Observations Particulières

Sur La Cure des hernies avec Gangrène

Par M. Puy

Chirurgien en chef de l'hôtel
Dieu à Lyon

L'expérience a démontré que lorsque la gangrène avoit obligé d'attacher une portion d'intestin dans une hernie suivie d'étranglement, la réunion des extrémités coupées; si elle étoit possible, devoit être préférée à tous les autres moyens qu'on a mis en usage jusqu'à présent pour opérer la cure de cette maladie. quelques puissent être les inconvénients auxquels cette réunion est quelque fois sujette, ils se lèvent toujours aux inconvénients des autres méthodes. cette idée ne s'écarte point du sentiment de monsieur Lویی exposés dans son fameux mémoire sur ce sujet, adopté par l'Académie. Mais au défaut de la Réunion, quelle ressource s'offre il? il s'en offre. C'est un anus artificiel; Or quel fond peut-on faire sur cette ressource? Voici comment Mr Lویی s'en explique: „contre laquelle pratique (des anus artificiels) „La seule objection qu'on puisse faire, se réduit à dire qu'un pareil égout pour les matières stercorales est une incommodité rebutante qui dure autant que la vie; et que cette allegation n'est que de préjugé. „Monsieur Lویی ne nous apprend point qu'il y ait des accidents qui puissent résulter des nouveaux anus, et quand il n'indique cette méthode que dans les cas où on ne peut pratiquer la Réunion; ces accidents qu'il auroit dû donner pour raison lui ont échappés; de sorte qu'à son égard aux termes de son mémoire; on pourroit trop facilement se livrer à cette ressource dont on seroit dupe; puisqu'en effet l'expérience me fournit nombre de preuves qui concourent à me persuader que c'est un moyen absolument désespéré dont le fruit est tout ou plus de prolonger un peu la vie du malade.



Ces preuves me semblent mériter quelques attention parcequ'il est assez important dans des occasions critiques d'apprécier au juste le danger d'une méthode, pour ne pas la préférer mal à propos, si elle se trouve en concurrence, ou pour ne pas s'y décider trop précipitamment, si elle paroît d'abord l'unique praticable.

Ce motif particulier me paraissant entrer dans les vues générales de l'Académie qui ont pour objet les progrès de l'art et le bien de l'humanité. Ce motif, dis-je, m'a déterminé à lui communiquer les observations qui sont la base de ces preuves, en les lui soumettant pour en juger et pour en faire l'usage qu'elles trouveront convenir.

Voici donc en quoy consiste le danger de la méthode, des anus artificiels. Lorsque après la séparation de la portion gangrénée d'un intestin, on a fixé son extrémité, qui répond à l'estomach, aux bords de la plaie pour y servir de nouvel anus, tôt ou tard cet intestin soit en dehors, en se renversant en lui même, ne tarde guère en cet état de souffrir un étranglement suivi de Gangrène, de pourriture, et sans remède.

ARC 15
d. 50
201

Principal inconvénient dont on sentira bientôt le danger et les suites funestes; il s'agit d'en contester d'abord l'existence, l'expérience m'en fournira les preuves.

Observation

Le 1^{er} avril 1752 on transporta dans cet hôpital une femme âgée de 42 ans qui avoit déjà souffert l'opération du Bubonocelle dans le Courant du mois de septembre 1751, pour une hernie inguinale avec étranglement du côté gauche. La répugnance insurmontable de la malade pour l'opération avoit été cause que l'intestin avoit eu le tems de se atterrir, et après s'être asuré par l'issue des matières alimentaires de l'extrémité de l'intestin qui répondoit à l'estomach, il l'avoit glissé aux serres de la division.

Cette femme étoit rétablie après promptement à l'incommodité près du nouvel anus, et d'une boîte de fer blanc attachée par une ceinture et destinée à recevoir les excréments qui sortoient involontairement mal digérés et toujours en diarrhée, quoiqu'elle eût la précaution de manger peu la nourriture. L'excrétion d'ailleurs ne se faisoit pas ^{sans} une douleur piquante presque toujours accompagnée du renversement de l'intestin que la malade faisoit rentrer après l'avoir fomenté avec du vin chaud et du sucre; et qu'elle maintenoit au moyen d'une compresse appliquée pendant quelques heures sur l'ouverture; elle avoit été menacée plusieurs fois d'étranglements dans ces différentes sorties de l'intestin; mais le danger dissipé, elle ne laissoit pas que d'agir, et de s'occuper à quelques petits ouvrages peu fatigants, jusqu'à ce qu'en fin à l'époque de son entrée en cet hôpital; seulement dès le matin de ce jour là, l'intestin sorti de plus d'un demi pied; la malade souffroit des douleurs cruelles accompagnées de Léquet et de vomissement, le visage étoit livide; le pouls consentie convulsif; l'intestin d'un rouge brun, en fin tous les plus fâcheux symptômes de l'étranglement étoient réunis pour rendre son danger plus pressant. Je convoquai quatre maîtres de l'art, et je mis en délibération quel

Cette
circonstance
sera l'objet
d'une attention
particulière

secours il convenoit de lui donner. il ne s'offroit que l'extirpation de la partie de l'intestin renversé qui étoit hors du ventre; mais on sentit bientôt que supposé que la malade soutint encore cette opération; ce qui même paroîtroit pas probable; on seroit encore obligé après cela de glisser l'extrémité de l'intestin aux bords de la plaie, ce qui le rendroit toujours sujet au renversement, et qu'ainsi successivement on auroit lieu d'extirper toute l'étendue des intestins grêles jusqu'à l'estomach.

L'art n'ayant donc point offert de Resourse stilles et efficaces; les progrès de la maladie augmentèrent vers le soir à un tel degré, malgré

Les remèdes tant internes qu'externes, que l'intestin étoit sorti au moins d'un pied & demi de longueur; en fin la malade mourut la nuit qui suivit, C'est à dire, la nuit du 2 au 3 du même mois. Je fis l'ouverture de son cadavre en présence de Mr pouteau fils, et des élèves en chirurgie de cet hôpital; j'observai d'abord que tous les intestins étoient rouges, livides, gonflés, tendus & presque ~~solides~~ tous ensemble, leurs membranes me parurent plus épaisses et plus obscures que dans l'état naturel; je trouvais l'épiploon fondu, qui mêlé avec le muilage du bas ventre imitoit après cette espèce de fièvre lymphatique qu'on remarque ordinairement après les inflammations gangreneuses de cette cavité. cette coëne couvroit le foie et remplissoit presque tous les interstices des viscères. Les veines du mésentère étoient pleines d'un sang noir et caillé; Enfin je m'assurai bien que les restes des intestins et l'estomac avoient été tirailés, que le retour du sang des veines avoit été empêché & que la mort en avoit été la funeste suite.

Le quatre août de la même année une paysanne des environs de cette ville fut amenée en cet hôpital, elle étoit dans le même cas que le sujet de l'observation précédente; elle avoit été opérée pour une hernie avec étranglement & pourriture; un anus artificiel donnoit issue aux excréments l'intestin étoit sorti et se renversoit, ces accidents fréquents la retenoient au lit depuis trois mois; Lorsqu'à une de ces fortes survint étranglement suivi de symptômes dangereux qui déterminèrent les siens à la traduire en cet hôpital; mais c'étoit trop tard, et elle mourut le même jour avant qu'on eut pu tenter de lui donner quelque secours; un voyage m'empêcha de faire l'ouverture de son cadavre, mais je suis persuadé que cette maladie étant si semblable à la première, cette ouverture n'auroit rien offert de particulier. Voici une autre observation qui quoique différente pour les circonstances des premiers tems de la maladie, fournit l'exemple de la même terminaison.

~~En cet hôpital~~ en cet hôpital, il avoit le visage ~~bon~~

Le 20 mars 1750 un garçon serrurier sujet à une hernie au ferotum du côté droit fut maltraité par ses compagnons qui le laissèrent meurtre, et dans les symptômes les plus urgents d'un étranglement.

On l'apporta en cet hôpital, il avoit le visage ~~bon~~ d'un rouge brun, les pouls convulsifs et contents; Les yeux aigus, saillants, et s'avancant hors de l'orbite, une fièvre continuelle; Les extrémités ~~froides~~ froides, la tension du bas ventre, le hoquet fréquent annonçoient le peril pressant du malade; Je lui fis d'abord ouvrir la urine et je convoquai M. M. qui déciderent bientôt pour l'opération; J'y procédai sans perdre de tems, et je trouvai dans le sac un gros paquet d'épiploon



Après une portion considérable d'intestin grêle. après avoir dilaté
L'anneau; j'extirpai L'Epiploon en entier; et ne trouvant pas L'intestin
après altéré pour ne pouvoir se rétablir dans Le ventre je m'efforçai
de Le réduire; Mais ce fut en vain; car Lorsqu'une portion rentroit
Il en sortoit une autre aussi considérable; on ne pouvoit attribuer
Ces effets qu'à La plénitude des intestins; et à la tension du bas ventre
Ce motif me fit proposer d'ouvrir L'intestin pour donner issue aux matières
qu'il renfermoit; on ne fut pas de cet avis; et on se contenta de lui
faire faire des fomentations et de lui donner des Lavemens; Le malade
ne s'en rendit pas; et les Symptômes firent de nouveaux progrès, Le
pouls s'éleva, L'oppression s'accrut; de sorte que persuadé que Le
malade alloit périr par La gangrène des intestins qui se seroit étendue;
Je résolus de lui donner des secours plus efficaces, Je consultai pour cela
Mr Lauret le célèbre chirurgien n'hésita pas de me faire ^{excuter} ~~faire~~ ce que
j'avois proposé quelques heures plutôt; à peine eu je ouvert L'intestin;
qu'il en sortit plus de deux livres de sang noir, grumelé et déjà très
coctisé; Sans aucuns excréments. ce ne fut pas tout; car, Monsieur
Lauret voyant que Les intestins étoient très enflés; fut d'avis que
j'extirpass tout ce qui étoit altéré. en conséquence j'en emportais de la
Longueur de trois pieds environ. Je passai ensuite un fil dans Le
mésentère; un peu avant vers Les parties saines, qui rapprocha Les
deux bouts de L'intestin; Je tordis Les bouts des fils ensemble; en
distinguant néanmoins celui qui répondoit à L'extrémité supérieure
de L'intestin d'avec L'autre, je Les fixais en dehors de la plaie; une
hémorragie qui survint dégagaa le ventre, et depuis ce temps là Le
malade commença à se mieux porter.

Je ne mis point Les Extrémités de L'intestin L'une dans L'autre,
parce que Les parties inutilisées et un peu contuses me sembloient devoir
suppurer; je me contentai de Les tenir rapprochées par Le moyen des
fils dont j'ay parlé.

J'administrai par intervalle les minoratifs au malade et trente jours
après Les matières s'étoient déjà partagées et sortoient autant par Les voyes
naturelles que par La plaie ou étoit déjà moins soignée pour Le Régime;
Lorsque Les compagnons du malade lui apporterent du vin et des
aliments peu convenables à Son état; il but et mangea avec eux au
delà de sa mesure; ce ne fut pas impunément; car Le soir du même jour
qui étoit Le 24^e arriv; il fut saisi d'un frisson des plus violents; qui fut
suivi d'une diarrhée compliquée de la sortie de L'intestin par renversement;
Je n'oubliai rien de ce que je crus pouvoit Le soulager; mais mes Soins
furent inutiles. Le hoquet continu, la tension de tout Le bas ventre
et Le délire terminèrent sa vie en moins de trente six heures.

J'ouvris son cadavre en présence de beaucoup de personnes de l'an. et
j'observai que les deux bords du mémentère qu'avoit laissé l'extirpation
de l'extirpation d'une de ses portions, s'étoient réunies et cicatrisées
~~par des brides en y formant une espèce ensembles~~ de même qu'avec
l'épisploon qui garantissoit la cicatrice par derrière en y formant une
espèce de noeud rouge et après solide.

Je conclus de là qu'on ne devoit imputer la mort du malade qu'à son
imprudence, puisque l'intestin à l'endroit de la cicatrice étoit après
solide pour résister à l'abord des matières poussées par l'action des
muscles du bas ventre, par celle du diaphragme par la contraction de
l'estomach et des membranes du conduit intestinal.

Dans ces trois observations le renversement de l'intestin semble être
un accident inévitable à la suite de l'opération; néanmoins ce
renversement n'y a point eu de causes particulières et déterminantes
qui ne puissent souffrir dans tous les autres cas des anus artificiels;
cela supposé, comme il est vrai, ses suites funestes ne méritent-elles
pas une sérieuse attention?

Mais avant que d'entrer dans les mécanismes de ce renversement,
suivons l'expérience; et après avoir énoncé les cas propres au sujet
examinons ceux qui ont du rapport en raisonnant par comparaison
à majori ad minus.

Les intestins grêles peuvent bien être sujets à se renverser. Les gros
intestins y sont sujets eux mêmes; j'en dis plus et parmi les derniers
le colon doit se renverser plus facilement que le rectum; la raison de
la différence, quoique d'ailleurs très sensible, se verra cy après. Or ne
faut-il pas que le rectum se renverse quelques fois et soit en dehors
de façon à entraîner de fâcheux symptômes.

Cette hernie du rectum n'est pas rare aux femmes et aux filles, les
enfants travaillés du calcul y sont fort sujets; et elle arrive ordinairement
aux adultes après les diarrées, et les dysenteries épidémiques.

L'expérience m'a vu comme en beaucoup d'autres cas
ne m'a pas laissé manquer de preuves.

Observation

Un fontellier nommé Claude Desvilles, âgé de 40 ans vint en cet hôpital
le 7^e 8bre 1752 il se plaignit seulement d'une violente colique; mais
le hoquet, le vomissement des matières fécales, la lividité du visage,
les extrémités froides, la tension du bas ventre firent soupçonner à
celui des médecins qui le vit d'abord, que de symptômes si fâcheux avoient
quelque autre cause; je fus en conséquence chargé de vérifier s'il n'avoit
point de hernies, je le visitai et je reconnus que l'intestin Rectum renversoit



Sortoit d'environ six travers de doigt; je n'allai pas chercher d'autres cause de tous les accidents dont j'ay parlé; je fis d'abord administrer au malade un Lavement émollient, et une potion Emperante avec quinze gouttes anodines —

Ce seul moyen calma Les accidents et Le Lendemain je fis La réduction de L'intestin; les mêmes remèdes continués rétablirent le malade En peu de jours —

Mais Le 14^{bre} suivant une indigestion renouvela le mal avec tous les Symptômes dans un degré plus violent; Le malade revint à L'hôpital Je luy donnai tous mes Soins, Lavements, potions, fomentations, rien ne fut utile, mais tout fut inutile; je ne pus réduire L'intestin qui sortoit de la Longueur près d'un pied, il se putrefia, et Le sujet mourut La nuit du 16 au 17 après avoir souffert des douleurs cruelles et très aigües Je fis L'ouverture de son cadavre aidé d'un des chirurgiens de cet hôpital; Je m'étois bien attendu à y trouver un ou plusieurs volicules, mais mes découvertes passerent de beaucoup mes conjectures, et je vis avec une surprise des plus grandes que Le colon tout entier replié de l'autre dans luy même s'étoit renversé et enroulé dans Le Rectum; avoit entraîné avec Luy Le Cecum et La portion de L'ileum qui lui est contigue, de sorte que cette portion de L'ileum étranglée et fortement reserrée dans Le cecum; comprimée au milieu des trois replis du colon, formoient un Volume égal à celui d'un saucisson de Boulogne, qui sortoit de la longueur d'un pied à peu près; Les parois de ces intestins avoient deux ou trois lignes d'épaisseur, Le mesentère et tous Les Viscères du bas ventre étoient engorgés, Les veines fort dilatées étoient remplies d'un sang noir et grumelé; et La Vessicule du fiel extrêmement pleine d'une bile noire. On sent combien Le mésocolon devoit être ploulongé, et forcement étendu, Le mesentère étranglé, Le cours du sang intercepté dans toutes ses veines; il en falloit bien moins pour causer La mort; ce prodigieux renversement des intestins ne laisse rien à désirer pour La preuve dont il s'agit ici; Les gros intestin quoique fort épais sont renversés et repliés d'une manière Surprenante. Le Rectum se trouve hors du ventre par un semblable renversement; néanmoins ce dernier excorcel fort; ses Cuivres sont épais, il est appuyé et maintenu dans sa place par Les parties environnantes qui forment une Résistance si forte qu'il en est plus affermi par trois bandes Ligamenteuses suivant La direction de son Canal —

Petionnera. On après cela que Les autres intestin qui sont fort souples, Libres et flotans dans La capacité de L'abdomen sujets d'ailleurs à des

Volontas, a des Reversements sans hernie; S'annoncera on dis je le
determinés par l'abord des matières et en conséquence de leur structure
qui offre ça et là des valvules, c'en a dire des pointes de Resistances, ils
s'avancent, se renversent, et sortent pour donner issue à ces matières,
le feu de changer par la playe; qui laisse l'operation du Bonocelle
à la Region inferieure du ventre, region vers laquelle ils sont determinés
par leur poids; et par la moindre Resistance
à savoir regard qu'a ces raisons; on sent que ce Reversement est tres
facile, et on n'en plus eut de doute de sa possibilité; Sur tout si on
ajoute à la compression des muscles du bas ventre, l'action du
Diaphragme, et celle de la membrane musculaine des intestins mêmes,
La surface interne de la portion de l'intestin contigue aux Lèvres de
La playe s'avance d'abord, et en se renversant fort peu a peu jusques
à ce qu'il successivement et par degrés une portion considerable se trouve
dehors de la tous les accidents qu'il n'en pas necessaire d'expliquer
Croiroit on que L'experience qui m'a donne lieu de faire ces
observations ne les a fournies qu'a moy, Je puis citer plusieurs maîtres
En chirurgie de cette ville qui ont observé comme moy le fait donc
il s'agit, et cela n'est pas Surprenant car cet accident a du être frequen
à raisons des causes qui y Concourent.

Un autre accident propre aux anus artificiels, C'est que Les aliments
fortement par leur nouvelle issue, a moitié digérés et presque toujours
en diarrhée, L'experience qui le prouve s'accorde en cela avec Le
Mécanisme de la digestion).

En effet on sçait que Les intestins forment un conduit libre et flottant
dans La capacité de L'abdomen; plissé; en zigzags le faisant plusieurs
Circonvolutions, de façon qu'il s'y rencontre après ordinairement 28
angles, sçavoir 26 aux intestins grêles, et deux aux gros. Ce conduit
a environ 56 a 57 pieds de longueur dans un adulte, et sans La
proportion de l'age.

Cette longueur et ces Circonvolutions sont nécessaires ^{pour} que La
digestion qui se perfectionne dans Les intestins ait le tems d'exprimer
tout Les chills des aliments qui parturent alors un plus grand Espace;
Les angles et les valvules concourent aussi au même effet en retardant
Le cours progressif de Les matières qui sont obligées en plusieurs endroits
de remonter contre leur propre poids; de sorte que celles qui sont Les plus
avancées dans Le conduit; arrêtées par Les angles et les valvules, soutiennent
L'effort de celles qui suivent lorsqu'elles sont impetueusement poussées
par L'action du Ventricule, du Diaphragme et des muscles de L'abdomen



Il faut ajouter à tout cela La Résistance qu'oppose La
Valvule musculaine du Cecum dans La quelle Les Aliments ne se
jetten que par une Voie oblique —

Or n'est il pas constant que tant de précautions prises par
La nature pour prolonger Le séjour de ces Substances
dans Les Visceres, ont été pour biter de Les exposer plus Longtemps
à la chaleur du bas ventre; à L'action des causes qui concourent
à les broyer et à les mêler avec Les humeurs digestives dont leur
route est arrosée; ces précautions étoient utiles, elles étoient
aussi absolument nécessaires;

Donc Les matières qui traversent par un anus artificiel ayant eu
un espace plus court à parcourir; ayant fait moins de séjour dans les
intestins qu'il ne convenoit, doivent être mal conditionnées; et plus
mal digérées encore, d'où résultent tous Les accidents annexés au
défaut de digestion —

Li à cet égard je remarque que La différence de Longueur des
L'intestins dans Les anus artificiels; doit mériter de notre part une
certaine attention; car dans Les uns Les matières n'auront à
parcourir que 17 ou 18 pieds; dans Les autres 24 ou 30, comparées à
38 ou 37 qui sont La même de La Longueur naturelle.
Cette différence est facile à concevoir si L'on fait attention que dans
Les différentes hernies sont assez ordinairement comprises —
différentes portions des intestins grêles par exemple dans Les
Entéromphales; C'est Le Jejunum ou environ la partie moyenne des
grêles; Les Epiploceles du côté gauche Recouvrent ordinairement
Le commencement de L'iléum; et celles du côté droit; L'extrémité
du même intestin qui s'abouche avec Le Cecum; ou Le Cecum
Luy même par conséquent un anus artificiel du côté droit —
devroit être moins dangereux parce qu'étant formé d'un intestin
plus éloigné de L'estomach; il favoriseroit plus La digestion; les
alimens ayant alors 30 ou 10 pieds de plus à parcourir; que dans
Les autres hernies; car il est bien permis de supposer que Les
accidents d'un anus artificiel; diminuent à raison de son éloignement
de L'estomach et à proportion qu'il en est plus près de L'intestin qui dans
L'état naturel en charge de L'excretion —

Il a des
ordinairement,
parce que j'y ay
vu quoique
rarement le
colon lui même
mais c'est

des hernies
artificielles

Cela sont Les accidents annexés aux anus artificiels; Celles sont
leurs suites funestes; puis je me flater que L'exposé que j'en fais;
et les preuves que j'en donne prouvent de quelques utilités monbut;
comme je L'ai annoncé d'abord. En de faire bien sentir Les

Inconvénients de cette méthode afin qu'on ne s'y livre pas
facilement; et qu'à moins qu'elle ne se trouve indubitablement
l'unique praticable, après l'examen nécessaire, on lui
préfère toujours la Réunion.

Qu'il me soit permis encore pour appuyer les raisons de cette
préférence; de comparer les inconvénients de l'une et l'autre
opération, et de rendre plus sensibles leurs différences on verra
devoir ce qu'on a à espérer ou à craindre d'un anus artificiel;

voyons ce que l'on doit craindre de la Réunion.
La cause la plus ordinaire qui fait perdre le fruit de la cure opérée
par la Réunion; est l'incertitude du malade à observer le
Régime convenable; l'incertitude très dangereuse, parce que le
diamètre de l'intestin étant diminué à l'endroit de la cicatrice
qui a Reserré et Rapproché ses parois; il arrête les matières
alimentaires qui abordent en trop grande abondance et qui ont
trop de Consistance ou trop peu de fluidité pour s'engouffrer à travers
l'issue étroite qui reste donc. Semble une rupture, et un épanchement
dans le ventre; mais cela ne dépend point de l'opération; le
Régime plus ou moins sévère; est nécessaire à tous les convalescents
et on n'est trop heureux de pouvoir à ce prix se mettre à l'abri des
dangers; D'ailleurs il est des moyens assez efficaces de prévenir
ce rétrécissement, ou plutôt on le prévient au moins en partie
Lorsqu'on a pu faire entrer le bout supérieur de l'intestin dans
l'inférieur et qu'on l'y a maintenu; ou seulement Lorsqu'on
les a simplement rapprochés et abouchés par le moyen d'un
fil passé à travers le méscntère qui le plie et le fait franchir.
Par cette pratique il y a d'une utilité très grande en beaucoup de cas.
En fin Lorsque par l'usage des Lavements administrés exactement
dès le premier jour de l'opération, on a su entretenir la
souplesse de l'intestin et qu'on est parvenu à faire d'abord
repandre à une partie des matières son cours ordinaire.
Si on peut prévenir les accidents de la Réunion, on peut peut-être
être bien aussi y remédier, quand il n'est plus temps de les prévenir.
De violentes Coliques annoncent une rupture et un épanchement
prochain; de plus fâcheux Symptômes rendent le danger pressant;
on présume que c'est la Cicatrice des Extrémités réunies qui est
le siège et la cause passive du mal; on ne peut guères en



Avoir des signes bien positifs; Mais positifs ou non, après avoir
essayé tous les autres moyens s'ils ont été inutiles ne pourroit on
pas faire une ouverture comme pour une nouvelle operation.
Quoiqu'il en soit de cette Ressource; Je reviens à mon paratette
et je dis que d'un coup d'œil on peut aisément juger et se
décider en faveur de la Réunion, compensation faite des
accidents de l'une et l'autre operation; Les preuves que J'ay
données du danger des anus artificiels; acheminent de déterminer
La preference et de fixer à quoi l'on doit s'en tenir à cet égard
et c'en ce que je m'ettois proposé.
Il me reste une ou deux observations assez intéressantes en
faveur de la Réunion; me seroit il permis de les ajouter icy —
avant de finir; Je sçai que le mémoire de Monsieur Lottin
ne laisse rien à désirer sur ce sujet; mais mille circonstances
peuvent varier et faire de chaque observation; L'objet d'une
attention particulière; Je vais donc exposer celles dont il s'agit

Observation

Une fille domestique à la campagne atteinte d'une hernie
inguinale du côté droit, fut apportée en cet hospital elle avoit
souffert l'étranglement assez longtems, et la pourriture avoit
gagné l'intestin et les tégumens, ses limites étoient marquées de
sorte qu'après avoir séparé la peau et la graisse, je fis appliquer
des Cataplasmes, l'intestin fut bientôt percé et les Excremens
sortirent par le milieu de l'ulcère; Le septième jour du traitement
l'escarre des tégumens et du tissu cellulaire se détacha, l'ulcère
se détergea bientôt après l'ouverture de l'intestin parut. Mais
au moyen des Lavemens administrés fort souvent dès le
commencement de la maladie; Les Excremens Reprirent leur route,
La Cicatrice se forma insensiblement, et avant deux mois la
malade fut guérie absolument et solidement sans avoir cependant
observé des Régime austère —

J'ay connu une dame, de cette Ville, et plusieurs Chirurgiens la
Connoissent aussi, qui a été dans le même cas, elle est guérie
depuis quatre années et jouit des ce tems d'une parfaite santé;
elle a même accouché depuis fort heureusement; quoique la
Circonstance de cette maladie précédente fut fait beaucoup craindre
pour elle —

Le nommé Reverony âgé de 40 ans étoit détenu dans cette maison pour cause d'aliénation d'esprit; il étoit sujet à une hernie au pectum du côté gauche qui ne l'avoit point encore incommodé; mais le jour de la fête dieu 1758 il y survint un étranglement à l'intestin li à l'epiploon qui formoient cette hernie; cette maladie entraîna d'abord tous les symptômes ordinaires; mais le sujet n'étoit pas en état de se plaindre et l'on ne s'apperceut de son danger que par l'infection que causoit la pourriture des regumens et des parties déplacées.

Je fis l'ouverture de la tumeur en présence de M. M. Jara et poteau. li je trouvais en premier lieu une portion considérable de l'epiploon noir et gangréné que j'extirpai entièrement, et plus de trois pieds d'intestin qui étoient aussi corrompus et putréfiés; je passai un fil dans le mésentère qui en le serrant tenoit les extrémités des intestins rapprochées; comme les matières fécales s'avançoient continuellement par la playe, je me contentai de la faire couvrir de compresses blanches renouvelées trois fois par jour.

Je n'avois jusques alors coupé et extirpé que dans les parties mortifiées; c'est pourquoi je neus point d'hémorragie, mais huit jours après l'escarre en détachant le reste de la pourriture, en entraîna une considérable par les vaisseaux du mésentère, qui relâcha beaucoup le ventre jusque la fort enflé et fort tendu; cette hémorragie s'arrêta facilement soit par le vitriol en poudre que je soufflai sur les vaisseaux ouverts, soit par la faiblesse du malade, au reste; jamais peut être hémorragie ne fut plus salutaire à un malade; celui cy reprit l'usage de ses sens; et ce fut la l'époque du rétablissement de sa raison, qui a été solide, il revint comme d'une espèce de léthargie; ne se ressouvénant ni de l'opération ni de son état précédent, il reprit appétit, et je lui permis par degrés et peu à peu l'usage des aliments tous les jours on lui administroit un lavement qui entretenoit la liberté de la portion inférieure des intestins et leur souplesse; néanmoins n'ayant jamais pu empêcher de manger prodigieusement et en secret pendant deux mois entiers les matières fécales ne sortirent pas ailleurs que par la playe; jusqu'à ce que en fin au bout de ce temps ayant été purgé; elles commencèrent à se partager, et à sortir en partie par la voye naturelle insensiblement. la quantité de celles qui avoient prises cette voye, augmenta les portions du mésentère coupées et rapprochées par le



Moyen des fils, ce Cicatrisement, La Cicatrice extérieure s'avancant
aussi & fut parfaite un mois après, le malade sortit alors de
l'hôpital bien portant, mais à peine eut-il passé deux mois dehors
qu'un Excess fit rouvrir La Cicatrice; il vint me trouver; & je lui fis
faire une boîte de fer blanc qu'il apporta jusqu'à ce que peu de
temps après; La cicatrice se refermât toute seule; & se referma
si solidement qu'elle ne s'est plus rouverte.

C'est par là que je finis les observations que j'avois à présenter à
l'Académie pour le présent: puis je s'espère qu'elle les recevra
avec quelque bonté: je serois trop heureux & trop flatté. Si aux
yeux d'un Tribunal si éclairé, elles paroissent dignes de
quelque attention. au moins Ose je croire qu'elle ne désapprouvera
pas. Le motif qui m'a fait agir puisque C'est Le zèle qui
l'anime elle même pour Les progrès de L'art & du bien public,
Ce même zèle m'animera toujours & toujours je me ferai en
Devoir de communiquer à cette illustre Société Ce que je croirai
pouvoir concourir à ses Vues.

10. 52.

quatre p. 10.